

Модуль 2
«Загальні питання психіатрії та загальна
психопатологія»

Пацієнт віком 32 роки, дивлячись на малюнок на шпалерах, бачить, як лінії починають рухатися, утворюючи силуети химерних тварин. Замість люстри, що висить на стелі, бачить гігантського восьминога. Встановіть психопатологічний симптом:

Зорові галюцинації
Дереалізація
Парейдолічні ілюзії
Функціональні галюцинації
Псевдогалюцинації

Парейдолічні ілюзії

Хворий 34-х років перебуває на лікуванні у психіатричній лікарні з приводу загострення шизофренії. Об'єктивно: перебуває у ліжку, рухливо загальмований, контакт відсутній. На запитання не відповідає. Позиція одноманітна, пацієнт гіпомімічний, наявний симптом «хоботка», воскова гнучкість м'язів, симптом «повітряної подушки». В такому стані лишається близько тижня. Харчування парентеральне. Визначте наявний синдром розладу рухово-вольової сфери:

Екзогенний ступор
Кататонічний ступор
Депресивний ступор
Психогенний ступор
Апатичний ступор

Кататонічний ступор

Жінка 78-ми років скаржиться доньці, що її сусідка систематично краде у неї консервацію з підвалу, намагається її отруїти, розкидаючи по городу «отруту». В якості «доказів» показує на добрива, що були раніше завезені сином хворої. Який психопатологічний синдром можна припустити?

Паранояльний
Депресивний
Дементний
Галюцинаторний
Деліріозний

Паранояльный

Хлопець 18 років перебуває на лікуванні в терапевтичному відділенні з приводу загострення хронічного бронхіту. З 6 років страждає на епілепсію. На фоні підвищення температури до фебрильних цифр розвинувся епілептичний статус у вигляді тоніко-клонічних судом. Яка Ваша найперша тактика у цьому разі?

Організація консультації психіатра
Переведення до психіатричного стаціонару
Надання невідкладної допомоги на місці
Переведення до неврологічного відділення
Переведення до реанімаційного відділення

Надання невідкладної допомоги на місці

Чоловік 22 років лежить у ліжку, високо піднявши голову, не відчуває незручності в такій позі. У бесіду вступає неохоче, реагує на шепітну мову, відповіді однослівні. Обличчя байдуже, гіпомімічне, чоло наморщене, губи витягнуті трубочкою. Рухається дуже мало, часто надовго застигає в мало зручній позі. Такий стан розвинувся поступово, протягом тижня без видимих причин. Діагностуйте психічний стан хворого:

Екзогенний ступор
Депресивний субступор
Апатичний субступор
Кататонічний субступор
Психогенний ступор

Кататонічний субступор

Пацієнт віком 39 років виглядає пригніченим, похмурим, насупленим. Настрій значно знижений, не бажає ні з ким розмовляти. Із найменшого приводу стає роздратованим, агресивним, брутально лається, намагається битися. У часі та місці перебування орієнтований правильно, маячних ідей та викривленого сприйняття не виявлено. Який емоційний стан спостерігається у пацієнта?

Гнівлива манія

Слабкодухість

Паратимія

Дисфорія

Патологічний афект

Дисфорія

Рідні чоловіка 36-ти років звернулися до лікаря зі скаргами на зміни у його поведінці. Під час опитування чоловік повідомив, що чує голоси у своїй голові. Його мовою хтось керує та примушує говорити. Він зазначає, що бачить події, які трапляються за межами кімнати, у якій він знаходиться. Думки його плинуть самі по собі, всупереч його бажанням. Інколи навіть два потоки думок одночасно. Під час подальшого опитування він повідомив лікаря, що має підозру щодо свого перебування під наглядом засекреченої наукової організації, яка ставить над ним експерименти. Який першочерговий висновок щодо стану пацієнта буде найбільш точним?

Параноїдний синдром

Синдром слухового галюцинозу

Парафренний синдром

Психосенсорний розлад

Синдром психічного автоматизму

Синдром психічного автоматизму

Чоловік 78 років правильно називає своє прізвище, ім'я, дату народження. Не може назвати поточну дату, свій вік, дезорієнтований у місці перебування. Не пам'ятає про смерть дружини, яка померла 5 років тому, а також нічого не може повідомити про останні роки свого життя. Мовлення уповільнене, словниковий запас обмежений, часто не може згадати назви предметів. У пробі на запам'ятовування десяти слів відтворює три слова. Прості арифметичні дії виконує з помилками. Не може пояснити сенсу поширених прислів'їв і приказок. Який синдромальний діагноз є найбільш імовірним?

Маячний синдром

Деменція

Депресивний синдром

Маніакальний синдром

Галюцинаторний синдром

Деменція

У хворого спостерігається відчуження психічних функцій, свого «Я»: «я став якимось іншим, відчуваю це, але описати не можу», «це і я, і не я», «думки мої в тумані, вони не мої», «мову свою чую десь збоку», «усі мої відчуття пропали». Визначте психопатологічний синдром:

Дереалізації
Депресивний
Деперсоналізації
Параноїдний
Іпохондричний

Деперсоналізації

Чоловік 47-ми років страждає на рак легень в термінальній стадії. Розповідає, що протягом останніх 2-3-х тижнів помітив зміни у своєму психічному стані: бачить ввечері покійну матір, яка кличе до себе, відчуває запах сирії землі, гнилого листя, бачить незнайомих людей, які несуть труну. При цьому відчуває страх. Які симптоми психічних розладів у хворого?

Ілюзорні розлади
Психосенсорні розлади
Маячні ідеї
Справжні галюцинації
Депресивні розлади

Справжні галюцинації

Чоловік 70-ти років хворіє на ішемічну хворобу серця. Настрій помітно знижений, тривожний. На тлі тривалого безсоння з'явилися страхи, небажання жити, думки покінчити з собою. Подовгу сидить у одній і тій самій позі, відповідає не одразу, тихо, монотонним голосом. На обличчі вираз страждання, болю, страху. Який провідний психопатологічний синдром?

Параноїдний синдром
Обсесивний синдром
Депресивний синдром
Фобічний синдром
Астенічний синдром

Депресивний синдром

Чоловік 31-го року багато років лікується у психіатра. На тлі тривалого безсоння з'явилися страхи, думки покінчити з собою, намагався повіситися. Настрій помітно знижений, від лікування відмовляється. Які дії є найбільш рекомендованими для профілактики суїциду хворого?

Амбулаторне лікування
Госпіталізація в неврологічне відділення
Психотерапевтична бесіда
Госпіталізація в психіатричну лікарню
Суворий нагляд вдома

Госпіталізація в психіатричну лікарню